

CALFOSMAG Registro ICA No. 9898



BENEFICIOS

CALFOSMAG FERTISOL. Es un polvo seco, con 2% de humedad, color café claro, enmienda minera resultado de la trituración, mezcla de calcio, magnesio y azufre (El Trio Dinamico) con una cuota adicional de fósforo asimilable lo que hace del CALFOSMAG FERTISOL la enmienda mineral más económica y efectiva del Mercado Nacional.

Su conductividad eléctrica 0.02ds/m, una humedad de solo 2% y su densidad mineral 1.48Gr/Cm3 enmarcan a CALFOSMAG FERTISOL dentro de la NTC 5167 norma técnica colombiana que regula y controla los productos para la industria agrícola.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Fósforo Total (p2o5)*	13.0%	Magnesio total (MgO).....	6.9%
Calcio total (CaO)	36%	Azufre Total (S)	0.15%

*Este fósforo es de lenta asimilación

TABLA DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	FORMA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
ARROZ	5Bts/Há	AL VOLEO EN PRESIEMBRA EN LABORES DE ARADO	BIEN INCORPORADO CON LA ÚLTIMA RASTRILLADA. SEMBRAR 30 DÍAS DEPUÉS OJALA CON SUELO HUMEDO
CAFÉ-CACAO	300Gr/PLANTA 2Kgr/ÁRBOL	SIEMBRA AL FONDO DEL HOYO TIERRA AL MEDIO. PRODUCCIÓN DESPUÉS DE LA COSECHA EN ZONA DE RAICES	
PLATANO-BANANO	1Kgr/SITIO 2Kgr/SITIO	PLATANO Y BANANO . SIEMBRA MEZCLADO CON TIERRA DEL SUELO	REPETIR DOSIS EN CLICOS SEMESTRALES
PAPA	1Bts/CARGA DE SEMILLA	SOBRE EL SURCO TAPADO	BAJO LA SEMILLA CON TIERRA AL MEDIO
PALMA DE ACEITE	2Kgr/PALMA/AÑO	ENTRE CALLES. NO ZONA DE PALERA	MANEJAR DOSIS Y FRECUENCIA DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE BASES
FRUTALES MANGO - AGUACATE -	200Gr/PLANTA 500Gr/ÁRBOL	AL TRANSPLANTE EN FONDO DEL HOYO TIERRA AL MEDIO EN PRODUCCIÓN 1 VEZ AÑO GOTERA DEL ÁRBOL	EN ÉPOCA DE LLUVIA O SUELO HUMEDO
CITRICOS NARANJAS-LIMONES-	500Gr/PLANTA 500Gr/PLANTA 1Kgr/ÁRBOL	SIEMBRA FONDO DEL HOYO DESARROLLO GOTERA DEL ÁRBOL PRODUCCIÓN GOTERA DEL ÁRBOL	TIERRA AL MEDIO SEMESTRE ZONA DE RAICES TRIMESTRE
HORTALIZAS TOMATE-PIMENTON, BROCOLI-LECHUGA-CEBOLLA - PEPINO - ABICHUELA AHUYAMA-PATILLA-MELON-PAPALLA-GUANABANA	100Gr/SITIO/HOYO SIEMBRA 200Gr/SITIO PRODUCCIÓN 500Gr/ÁRBOL	REVUELTO CON LA TIERRA DEL HOYO 30 DÍAS ANTES DEL TRANSPLANTE O SIEMBRA DE LA SEMILLA AL FONDO DEL HOYO TIERRA AL MEDIO	OJALA DE 15 A 30 DÍAS ANTES DEL TRANSPLANTE 30 DÍAS ANTES DEL TRANSPLANTE O DE LA SIEMBRA DE LA SEMILLA
MAÍZ-SORGO	20Bts/Há	VOLEAR DURANTE LABORES DE ARADO	INCORPORAR CON LA ÚLTIMA RASTRILLADA.SEMBRAR 30 DÍAS DESPUÉS OJALA CON SUELO HUMEDO
CAÑA PANELERA PLANTILLA	1Bts/10mts LINEALES DE SURCO	TIERRA AL MEDIO	SIN HACER CONTACTO CON LAS YEMAS DEL MATERIAL VEGETATIVO
PIÑA-YUCA	100Gr/SITIO	EN EL SITIO DE SIEMBRA ALREDEDOR DE LA PLANTA	TAPARLO CON TIERRA
PASTOS	CORTE 1Bts/Há PRADERAS 10Bts/Há	INCORPORAR EN LABORES DE ARADO INCORPORAR EN LABORES DE ARADO	SEMBRAR 30 DÍAS DESPUÉS OJALA CON SUELO HUMEDO
GERMINADORES	100Gr/m2/CAMA	EN MEZCLA CON EL SUSTRATO O SOBRE LA SUPERFICIE	MANTENER BUENA HUMEDAD EN LAS ÁREAS DE GERMINACIÓN. NO MEZCLAR CON HERVICIDAS O DESINFECTANTES
FLORES	500Gr/m2/CAMA	AL VOLEO E INCORPORARLO 30 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA	EFFECTUAR UN RIEGO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN
ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE SUELOS	2Kgr/m2	AL VOLEO Y CUBRIRLO CON TIERRA	PARA SECTORES ALTAMENTE EROSIONADOS O ZONAS DE ALTO DESGASTE